

<b>활용제목명</b>	조숙, 단간, 다수성 율무 '조현'(Johyun, 연천 8호) 육성					
<b>연구개발자</b>	<b>소속기관</b>	경기도농업기술원 (북부농업시험장)	<b>성명</b>	장정희	<b>전화 및 e-mail주소</b>	031)229-6152 jjh7648@gg.go.kr
<b>공동개발자</b>	"	경기도농업기술원 (작물연구과)	"	이은섭	"	031)229-6151 yies07@gg.go.kr

**- 새로 육성된 조현율무의 주요 특성은 -**

- 조숙 : 만생종인 율무 1호보다 15일 조숙
- 단간 : 율무 1호보다 22cm 단간으로 재배관리 용이
- 다수 : 율무 1호보다 18% 증수
- 종피색 : 암갈색

**1. 구 분 : 육성품종**

**2. 육성내력**

- 가. 교배조합 : (수원6호×오카야마)×UCN300-25
- 나. 교배년도 : 1992
- 다. 계통육성 : 1993~1997
- 라. 생산력검정시험 : 1998, 2001(2개년)  
※ 1999~2000년 : 태풍으로 동계 증식
- 마. 지역적응시험 : 2002~2004(3개년)
- 바. 육성기관 : 경기도농업기술원 북부농업시험장
- 사. 육성자 : 장정희, 이은섭, 최병렬, 김인재, 박중수, 김성기, 김희동

**3. 적응지역**

- 가. 중부지역(남부지역과 제주도는 실증시험 후 보급)

**4. 재배상의 유의점**

- 가. 신장~출수기에는 도복에 약하므로 추비 위주로 시비할 것.
- 나. 밀식할 경우에는 간이 약화되어 도복과 잎마름병 발생이 심해지므로 적절한 재식밀도를 확보할 것.
- 다. 수확이 지연될 경우 탈립의 우려가 있으므로 전체 종실의 70~80%가 암갈색을 나타냈을 때 수확하여야 함.